

Бинавит С

Описание лекарственной формы

Шипучие таблетки №20, массой 3,8 г.

Состав

Мальтодекстрин (или декстроза (носитель)), L-аскорбиновая кислота (витамин С), лимонная кислота (регулятор кислотности), гидрокарбонат натрия (регулятор кислотности), полиэтиленгликоль (стабилизатор), ароматизатор Апельсин, сукралоза (подсластитель), L-лейцин, рибофлавин (краситель).

Биологически активное вещество	Содержание в суточной дозировке (1 таблетка), мг	Рекомендуемый уровень суточного потребления ¹ , мг	Процент от рекомендуемого уровня суточного потребления
Витамин С	не более 900	60	1500 ²

¹ согласно ТР ТС 022/2011;

² не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Описание и свойства

Витамин С – это один из самых известных антиоксидантов, который поступает с едой, и должен ежедневно присутствовать в оптимальном количестве для нормального функционирования организма.

Витамин С помогает укреплять иммунитет, снижает воспалительные процессы, нейтрализует свободные радикалы. Этот микроэлемент участвует в обмене веществ, крайне важен для усвоения железа, синтеза коллагена, а также помогает выводить токсичные вещества.

Его часто применяют в сезоны простуд, для профилактики преждевременного старения, при повышенных физических и эмоциональных нагрузках.

Для того, чтобы вовремя пополнять запасы витамина С в организме, был создан Бинавит С в оптимальной суточной дозировкой 900 мг.

В жидкой форме витамин С быстрее проникает в кровь и легко усваивается организмом. А его вкус делает прием приятным и освежающим.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище.

Не является лекарственным средством.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Показания к применению

В качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника витамина С.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения

Взрослым принимать по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, предварительно растворив в 200 мл воды комнатной температуры. Продолжительность приема 20 дней. При необходимости курс можно повторить.

Условия хранения/срок годности

В сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C. Срок годности: 3 года с даты изготовления.